

## **Absage: Schnittkurs Sommerschnitt / Erziehungsschnitt an Kernobstbäumen**

Am Samstag 20. Juli sollte unser diesjähriger Schnittkurs zum Sommerschnitt / Erziehungsschnitt am Kernobst stattfinden. Da witterungsbedingt derzeit das Triebwachstum noch nicht abgeschlossen ist, wird der Schnittkurs abgesagt.

### **Sommerschnitt an Kernobst**

**Zwischen Ende Juli und Ende August kann der Sommerschnitt erfolgen, denn in der Regel ist dann das Triebwachstum abgeschlossen. Wird zu früh geschnitten, treibt der Baum nochmal aus, die späten Triebe reifen vor dem Winter nicht mehr aus und sind dadurch anfälliger für Frostschäden.**

Maßvolle Sommerbehandlungen im belaubten Zustand können bei allen starkwachsenden Apfelbaumarten angewendet werden. Sie hemmen das Triebwachstum durch Wegnahme von Assimilationsfläche und fördern gleichzeitig vermehrte Blütenbildung im Folgejahr. Trockenes und gemäßigt warmes Sommerwetter sorgt außerdem für sehr gute Wundheilungsbedingungen am Gehölz.

Nicht angesagt ist ein Sommerschnitt bei schwach wachsenden Gehölzen, bei sehr feuchter Witterung (Gefahr des Eindringens von Pilzsporen) sowie bei hoher Sonneneinstrahlung und Hitze (Sonnenbrandgefahr für Früchte und innenliegende Blätter und Jungtriebe)

Der Sommerschnitt am Kernobst wird jedoch immer nur ergänzend zum Winterschnitt durchgeführt. Es werden vor allem dicht und steil stehende, sowie überzählige Triebe entfernt. Dies hat zur Folge, dass (für eine gleichmäßigere Fruchtreife sowie eine bessere Fruchtqualität) mehr Sonne an die Früchte gelangt und eine lichte Krone bei Regen schneller wieder abtrocknet (was vor Pilzkrankungen schützt).

### **Erziehungsschnitt**

Der Erziehungsschnitt bezeichnet alle Schnittmaßnahmen, die in der Baumjugend zur grundlegenden Formung stattfinden. Überzählige und ungünstig stehende Triebe werden hierbei entfernt. Auch diese Maßnahmen können **ab Ende Juli, nach Abschluss des Triebwachstums** durchgeführt werden.

Sollten Sie solche Schnittmaßnahmen durchführen wollen, beobachten Sie ihre Bäume in den kommenden Wochen und greifen Sie erst nach Abschluss des Triebwachstums zu Schere. Nutzen sie hierfür möglichst eine Phase mit trockenem, bewölktem Wetter.